



ประกาศแนวทางปฏิบัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุผลผล
(Rational Laboratory Use,RLU)

เพื่อลดการตรวจที่มากเกินไป(Overutilization) และ/หรือ การตรวจที่น้อยเกินไป (Underutilization)
โรงพยาบาลศิริราช จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2569

.....

โรงพยาบาลศิริราช ขอประกาศแนวทางปฏิบัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุผล(Rational Laboratory Use) เพื่อลดการตรวจที่มากเกินไป (Overutilization) และ/หรือ การตรวจที่น้อยเกินไป (Underutilization) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โดยมีตัวชี้วัดสำคัญดังต่อไปนี้

Overutilization

1. มี pop-up แจ้งเตือนการสั่งตรวจ HbA1c ในผู้ป่วยเบาหวานไม่ให้สั่งตรวจซ้ำใน 90 วัน กรณีสั่งตรวจซ้ำให้ระบุเหตุผล
2. มี pop-up แจ้งเตือนการสั่งตรวจ LDL-Cholesterol ในผู้ป่วยเบาหวานไม่ให้สั่งตรวจซ้ำใน 90 วัน กรณีสั่งตรวจซ้ำให้ระบุเหตุผล
3. มี pop-up แจ้งเตือนการสั่งตรวจ Triglyceride ในผู้มารับบริการไม่ให้สั่งตรวจซ้ำใน 90 วัน กรณีสั่งตรวจซ้ำให้ระบุเหตุผล
4. มี pop-up แจ้งเตือนการสั่งตรวจ Cholesterol ในผู้มารับบริการไม่ให้สั่งตรวจซ้ำใน 90 วัน กรณีสั่งตรวจซ้ำให้ระบุเหตุผล
5. มี pop-up แจ้งเตือนการสั่งตรวจ Sputum culture ที่แพทย์ไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นโรค Pneumonia, Acute bronchitis กรณีสั่งตรวจนอกเหนือจากนี้ให้ระบุเหตุผล
6. มี pop-up แจ้งเตือนการสั่งตรวจ Urine Culture ที่แพทย์ไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นโรค Urinary Tract Infection, Acute pyelonephritis, Acute cystitis กรณีสั่งตรวจนอกเหนือจากนี้ให้ระบุเหตุผล

Underutilization

1. มี pop-up แจ้งเตือนการสั่งตรวจ HbA1c ในผู้ป่วยเบาหวาน หลังวันนัด 7 วัน เพื่อให้ติดตามคนไข้
2. มี pop-up แจ้งเตือนการสั่งตรวจ LDL-Cholesterol ในผู้ป่วยเบาหวาน หลังวันนัด 7 วัน เพื่อให้ติดตามคนไข้



ประกาศแนวทางปฏิบัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุผลผล
(Rational Laboratory Use,RLU)

เพื่อลดการตรวจที่มากเกินไป(Overutilization) และ/หรือ การตรวจที่น้อยเกินไป (Underutilization)

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2569

.....

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอประกาศแนวทางปฏิบัติการตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุผล(Rational Laboratory Use) เพื่อลดการตรวจที่มากเกินไป (Overutilization) และ/หรือ การตรวจที่น้อยเกินไป (Underutilization) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โดยมีตัวชี้วัดสำคัญดังต่อไปนี้

Overutilization

1. มี pop-up แจ้งเตือนการส่งตรวจ HbA1c ในผู้ป่วยเบาหวานไม่ให้ส่งตรวจซ้ำใน 90 วัน กรณีส่งตรวจซ้ำให้ระบุเหตุผล
2. มี pop-up แจ้งเตือนการส่งตรวจ LDL-Cholesterol ในผู้ป่วยเบาหวานไม่ให้ส่งตรวจซ้ำใน 90 วัน กรณีส่งตรวจซ้ำให้ระบุเหตุผล
3. มี pop-up แจ้งเตือนการส่งตรวจ Triglyceride ในผู้มารับบริการไม่ให้ส่งตรวจซ้ำใน 90 วัน กรณีส่งตรวจซ้ำให้ระบุเหตุผล
4. มี pop-up แจ้งเตือนการส่งตรวจ Cholesterol ในผู้มารับบริการไม่ให้ส่งตรวจซ้ำใน 90 วัน กรณีส่งตรวจซ้ำให้ระบุเหตุผล
5. มี pop-up แจ้งเตือนการส่งตรวจ Sputum culture ที่แพทย์ไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นโรค Pneumonia, Acute bronchitis กรณีส่งตรวจนอกเหนือจากนี้ให้ระบุเหตุผล
6. มี pop-up แจ้งเตือนการส่งตรวจ Urine Culture ที่แพทย์ไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นโรค Urinary Tract Infection, Acute pyelonephritis, Acute cystitis กรณีส่งตรวจนอกเหนือจากนี้ให้ระบุเหตุผล

Underutilization

1. มี pop-up แจ้งเตือนการส่งตรวจ HbA1c ในผู้ป่วยเบาหวาน หลังวันนัด 7 วัน เพื่อให้ติดตามคนไข้
2. มี pop-up แจ้งเตือนการส่งตรวจ LDL-Cholesterol ในผู้ป่วยเบาหวาน หลังวันนัด 7 วัน เพื่อให้ติดตามคนไข้